


# HAS: összpontszámok



■ Frontin ■ Xanax

1.ábra

# HAS: szorongás alskála

válaszadók

Kezelés elején

6 hét után

26 hét után

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Frontin

Xanax

Frontin

Xanax

Frontin

Xanax

nincs


enyhe

közepes

nagymértéku

súlyos

2.ábra



# HAS: félelmek alskála

válaszadók

Kezelés elején

6 hét után

26 hét után

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Frontin

Xanax

Frontin

Xanax

Frontin

Xanax


nincs

enyhe


közepes

nagymértéku


súlyos



# HAS: koncentráció és figyelemzavar alskála




# HAS: kardiovaszkuláris tünet alskála



5.ábra


# Bandelow kérdoív: pánikrohamok gyakorisága

Gyakoriság



# Bandelow kérdőív: pánikrohamok súlyossága

Súlyosság




■ Frontin ■ Xanax

7.ábra

# Bandelow kérdőív: agorafóbia


Elkerülés súlyossága






# Bandelow kérdőív: anticipátoros szorongás


Szorongás




# HAMD: összpontszámok



# Pszichés szubjektív tünetek



# Frontin és Xanax kezelés hatásossága



kis romlás     
  nem vált.     
  kis javulás  
 mérs. javulás     
  jelentos jav.     
  gyógyult